

QUAND FAIRE UN TEST DE DÉPISTAGE DU VIH ?

À **chaque fois** que vous pensez que c'est **nécessaire** ;
et aussi :

- ✓ si vous voulez arrêter l'usage du préservatif dans votre couple ;
- ✓ si vous voulez avoir un enfant, ou si vous êtes déjà enceinte ;
- ✓ si vous avez pris un risque (par exemple, rupture de préservatif ou pénétration sans préservatif avec quelqu'un dont vous ne connaissez pas le statut sérologique) ;
- ✓ si votre médecin ou un professionnel de santé vous le propose ;
- ✓ si vous voulez juste connaître votre statut sérologique.



**L'INFECTION PAR LE VIH PEUT ÊTRE DÉPISTÉE TRÈS VITE.
N'HÉSITEZ PAS À EN PARLER À UN MÉDECIN.**



Association **Afrique Avenir**
22, rue des archives
75004 Paris
Tel. : 01.42.77.41.31
Fax : 01.42.77.04.31
afrique.avenir@wanadoo.fr

Les actions de prévention conduites par
Afrique Avenir sont soutenues par :
**DGS, INPES, SIDACTION,
GRSP Ile-de-France**

Tous ensemble avec **Kassav** contre le sida



FAISONS LE DÉPISTAGE DU VIH

POURQUOI FAIRE UN TEST DE DÉPISTAGE DU VIH ?

Faire un test de dépistage permet de savoir si l'on est (ou pas) **porteur du virus**. Si l'on est contaminé(e), on peut bénéficier rapidement d'un **traitement efficace**. Les traitements actuels contre le VIH ne font pas disparaître l'infection, mais ils permettent :

- ✓ de bloquer l'évolution de l'infection vers la maladie / le stade sida. Aujourd'hui, l'espérance de vie d'une personne séropositive dépistée très tôt, bien traitée et suivie, se rapproche de celle d'une personne non contaminée ;
- ✓ de réduire le risque de transmettre le virus au(x) partenaire(s) ;
- ✓ d'avoir un enfant avec un risque très faible de transmission du VIH à celui-ci.

i PLUS VOUS ÊTES DÉPISTÉE(E) TÔT, PLUS LES TRAITEMENTS SONT EFFICACES.



OÙ FAIRE UN TEST DE DÉPISTAGE DU VIH ?

Dans une Consultation de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) ou un Centre d'information de dépistage et de diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles (CIDDIST). Le test est **gratuit et anonyme** ; **il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous**.

- Dans un laboratoire d'analyses médicales, sur ordonnance de votre médecin traitant. Le test est remboursé à 100 % par la Sécurité sociale. Les résultats sont confidentiels.
- Après d'une association qui propose des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD).

i POUR SAVOIR OÙ VOUS FAIRE DÉPISTER GRATUITEMENT PRÈS DE CHEZ VOUS :

www.sida-info-services.org
(rubrique « Où se faire dépister ? »),
ou par téléphone au :
0 800 840 800 (appel anonyme,
gratuit depuis un poste fixe).

COMMENT SE PASSE LE TEST DE DÉPISTAGE DU VIH ?

Le test de dépistage classique se fait par une **simple prise de sang**. On a le résultat en **moins d'une semaine**.

- Le résultat du test est **négatif** : vous êtes séronégatif. Cela veut dire que vous n'êtes pas porteur du VIH. Un **résultat négatif** n'est valable que pour soi, il n'est pas valable pour votre / vos partenaires. Si vous voulez arrêter d'utiliser le préservatif dans votre couple, votre partenaire doit aussi avoir fait un test.
- Le résultat du test est **positif** : vous êtes séropositif. Un **résultat positif** est vérifié tout de suite par une seconde prise de sang. Si ce test est lui aussi positif, cela veut dire que vous êtes porteur du VIH. Il existe des traitements. Il existe également un test que l'on fait avec une **goutte de sang au bout du doigt** (TROD : test rapide d'orientation diagnostique). Il est proposé par certaines associations.

i ATTENTION : LE DÉLAI POUR QUE LE RÉSULTAT NÉGATIF SOIT SÛR EST DE 6 SEMAINES APRÈS LA DERNIÈRE PRISE DE RISQUE, POUR UN DÉPISTAGE CLASSIQUE, ALORS QU'IL EST AU MOINS DE 3 MOIS POUR LE TROD.