

COMMENT ÇA MARCHE ?

- > Une goutte de sang est prélevée au bout d'un doigt,
- > Cette goutte de sang est mise en contact avec des solutions réactives afin d'établir ou non la présence d'anticorps dirigés contre le VIH, virus responsable du sida,
- > Quelques minutes plus tard vous avez le résultat.



LES TESTS DE DÉPISTAGE RAPIDE DU VIH SONT-ILS FIABLES ?

- > **OUI**, les tests de dépistage rapide atteignent **une fiabilité maximale trois mois après la contamination**.
- > Les tests utilisés en France sont marqués CE comme le veut la réglementation. Ces tests rapides peuvent être réalisés par des associations de lutte contre le sida habilitées et formées.

FAUT-IL ÊTRE À JEUN ?

- > **NON**, le test de dépistage rapide du VIH peut être effectué à n'importe quel moment, que l'on ait mangé ou pas.

LE TEST RAPIDE EST-IL ANONYME ET CONFIDENTIEL ?

- > **OUI**, le test rapide est anonyme si vous le souhaitez. Il est toujours confidentiel. Dans un CDAG ou dans une association, tout le personnel est astreint au secret médical.

CE TEST NE DÉTECTE PAS LES AUTRES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST)

- > Les IST multiplient le risque d'être infecté par le VIH.
- > N'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant qui vous remettra une ordonnance. Vous pourrez ainsi **compléter votre dépistage du VIH par celui des hépatites B, C de la syphilis et autres IST**.
- > Vous pouvez également vous rendre dans un centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) ou un centre d'information, de dépistage des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST).
Centre de dépistage anonyme et gratuit.

SE FAIRE DÉPISTER AUSSI POUR ENRAYER L'ÉPIDÉMIE !

- > Nous savons désormais qu'une personne dépistée tôt et mise sous traitement efficace ne transmet plus le virus. Cela permet d'allonger sa durée et sa qualité de vie.
Le dépistage devient ainsi plus que jamais un outil de prévention clé essentielle pour enrayer l'épidémie.
- > Pourtant en France environ 30 000 personnes ignorent qu'elles sont séropositives.
Sans le savoir, elles mettent en danger leur santé et peuvent transmettre le VIH.



Association Afrique Avenir

22 rue des archives, 75004 Paris - Tél : 01.47.77.41.31

Fax : 01.42.77.04.31 - www.afriqueavenir.com.fr

Programme ZAC : Prévention sida, IST et hépatites auprès des populations afro-caribéennes en France. Les actions de prévention conduites par Afrique Avenir sont soutenues par : le Ministère chargé de la Santé, l'Inpes, Sidaction, l'ARS Ile-de-France, la Région Ile-de-France et la Mairie de Paris.

Textes tirés du dépliant TROD - COREVIH - ILE-DE-FRANCE OUEST

Test rapide du VIH à résultat Immédiat



VOUS AVEZ EFFECTUÉ UN DÉPISTAGE AVEC TEST RAPIDE D'ORIENTATION DIAGNOSTIC (TROD)

> Ce test dépiste les infections par le VIH datant d'au moins 3 mois.



AGIR RAPIDEMENT APRÈS UN RISQUE ?

VOUS PENSEZ AVOIR PRIS UN RISQUE TRÈS RÉCENT ?

- En cas de prise de risque (rupture de préservatif, rapport sexuel non protégé), il est recommandé de se rendre aux urgences des hôpitaux (au mieux dans les 4 heures, au plus tard dans les 48 heures) afin d'évaluer avec un médecin l'utilité d'un **Traitement Préventif Post Exposition (TPE)**. **Ce traitement a pour objectif de réduire le risque de contamination par le VIH.**

VOTRE PRISE DE RISQUE EST INFÉRIEURE À 3 MOIS ?

- **Il est préférable de réaliser un test classique** dans un centre de dépistage ou en laboratoire.
Ce test a un délai plus court d'une séroconversion.

VOUS PENSEZ AVOIR ÉTÉ EN CONTACT AVEC LE VIH DANS LES 3 DERNIERS MOIS PRÉCÉDENT CE TEST ?

- Il est conseillé de **re-contrôler par un test 6 semaines après le dernier contact supposé avec le VIH** pour être certain de ne pas être infecté.



LE RÉSULTAT DU TROD EST NON RÉACTIF ET VOUS N'AVEZ PAS EU DE RISQUES D'EXPOSITION AU VIH DANS LES 3 DERNIERS MOIS PRÉCÉDENT CE TEST ?

- **Le résultat négatif signifie que vous n'êtes pas infecté par le VIH.**

Ce résultat est certain lorsque le test a été réalisé 3 mois (12 semaines) après la dernière prise de risque.

LE RÉSULTAT DU TROD EST INVALIDE OU INDÉTERMINÉ ?

- Ceci arrive rarement et les raisons sont diverses. Dans ce cas, le test réalisé ne peut pas être interprété et il n'est pas possible de vous donner un résultat. Il faut alors effectuer un test classique.
- Pour obtenir un résultat, vous pouvez vous rendre dans un laboratoire.
- Vous pouvez également vous rendre dans un centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG ou CIDDIST) sans ordonnance.

LE RÉSULTAT DU TROD EST RÉACTIF

- Ce résultat signifie pour vous une très forte suspicion d'infection par le VIH.
- **Il est indispensable de confirmer ce test par un test classique avec prise de sang.**
- Seul un médecin pourra vous annoncer le résultat après la réalisation d'un test classique à l'hôpital, dans un centre de dépistage ou un laboratoire.
- **N'hésitez pas à vous rendre à l'hôpital, dans un centre de dépistage (sans rendez-vous, test anonyme et gratuit) ou consultez un médecin** qui vous remettra une ordonnance pour une prise en charge médicale, si vous souhaitez faire le test dans un laboratoire en ville.
- **Dans l'attente du résultat de ce test, prenez les mesures de prévention (préservatif) pour vous protéger et protéger vos partenaires.**



Pour obtenir les adresses et horaires d'ouverture des centres de dépistage les plus proches de chez vous, téléphonez à :

 **Sida Info Service.org**
0 800 840 800
Appel confidentiel, anonyme et gratuit

www.sida-info-service.org