

RISQUE D'INFECTIONS

Plusieurs infections peuvent être transmises par la fellation aussi bien pour la personne qui pratique la fellation (suce) que pour celle qui la reçoit (se fait sucer).

RECEVOIR UNE FELLATION

TRANSMISSION COURANTE	TRANSMISSION POSSIBLE	TRANSMISSION PEU COURANTE	TRANSMISSION IMPOSSIBLE
Chlamydia		Hépatite B	VIH
Gonorrhée			
VPH			
Herpès (VHS)			
Syphilis			

FAIRE UNE FELLATION

TRANSMISSION COURANTE	TRANSMISSION POSSIBLE	TRANSMISSION PEU COURANTE	TRANSMISSION IMPOSSIBLE
Chlamydia		Hépatite B	
Gonorrhée		VIH	
VPH			
Herpès (VHS)			
Syphilis			



Association Afrique Avenir

22 rue des archives, 75004 Paris - Tél : 01.42.77.41.31
Fax : 01.42.77.04.31 - www.afriqueavenir.fr

Programme ZAC : Santé sexuelle, prévention du VIH/sida, IST et hépatites auprès des populations afro-caribéennes en France. Les actions de prévention conduites par Afrique Avenir sont soutenues par : le Ministère chargé de la Santé, Santé publique France, Sidaction, l'ARS Île-de-France, la Région Île-de-France la CPAM de Paris, la Mairie de Paris et le CD de Seine Saint Denis.



La fellation

Comment se protéger lors de la stimulation du pénis avec la bouche ?



EST-IL DANGEREUX DE SUCER OU D'ÊTRE SUCÉ ?

Plusieurs infections sexuellement transmissibles (IST) peuvent être transmises pendant une fellation.

QUAND REÇOIT UNE FELLATION (QU'ON EST SUCÉ)

- ➡ **Plusieurs IST** se transmettent facilement : Chlamydiae, Syphilis, Gonorrhée (dite blennorragie ou chaude-pisse), VPH (dit papillomavirus) et VHS (dit herpès).
- ➡ L'hépatite B peut se transmettre mais ce n'est pas courant.
- ➡ **Le VIH ne se transmet pas de cette manière.**

QUAND FAIT UNE FELLATION (QU'ON SUCE)

- ➡ **Plusieurs IST** se transmettent facilement : Chlamydiae, Syphilis, Gonorrhée (dite blennorragie ou chaude-pisse), VPH (dit papillomavirus) et VHS (dit herpès).
- ➡ L'hépatite B et le VIH peuvent se transmettre mais ce n'est pas courant.

POUR LE VIH : le risque est plus important si l'homme qui est sucé est en primo-infection par le VIH, c'est-à-dire dans les jours ou les semaines qui suivent après avoir été exposé au VIH. Durant cette période, la quantité de virus (charge virale dans le sperme) est très élevée.

POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ

Sida info Service :

0800 840 800

Tous les jours

24h/24h

Appel anonyme
et gratuit à partir d'un
poste fixe et d'un mobile

Afrique Avenir :

01 42 77 41 31

COMMENT SE PROTÉGER

Le préservatif fait barrière entre la bouche et le sexe. Il évite aussi le contact avec les fluides sexuels de l'homme. De nombreux fabricants proposent des préservatifs parfumés, plus fins, sans réservoir ou sans lubrifiant.

En l'absence de préservatif, il est vivement recommandé de suivre les règles suivantes :

POUR LA PERSONNE QUI SUCE

- ➡ **Éviter de recevoir le sperme dans la bouche.** Si cela arrive quand même, il est souhaitable de recracher le sperme, de rincer sa bouche à l'eau claire, sans frotter, et d'éviter les bains de bouche alcoolisés.
- ➡ Éviter la fellation dans les cas suivants :
 - **Quand on a des lésions (petites plaies)** aux lèvres et à l'intérieur de la bouche.
 - **Dans l'heure qui précède ou qui suit le brossage des dents** ou l'utilisation de la soie dentaire.
 - **Après avoir mangé des aliments qui pourraient blesser ou irriter la bouche** : croustilles, maïs soufflé, gomme extra-forte.

POUR LA PERSONNE QUI EST SUCÉE

- ➡ **Éviter d'éjaculer dans la bouche de votre partenaire.**
- ➡ Ne pas accepter d'être sucé si tu observes sur ton pénis : **boutons, plaies ouvertes, lésions, écoulement, etc.**, qui peuvent indiquer la présence d'une IST.
- ➡ **Le risque de transmission est augmenté en cas de problèmes buccaux** chez celui/celle qui pratique la fellation (gingivite, angine, candidose, plaie ouverte et récente comme des soins dentaires...).